

FRENECTOMIA LABIAL MAXILAR: RELATO DE CASO CLÍNICO

SANT'ANA. A. P.¹; CHEPERNATE. C.¹; ASSONUMA. A. L.¹; PONZONI. D.¹

¹Departamento de Cirurgia e Clínica Integrada, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista (Unesp).

A ação do freio labial maxilar pode ocasionar o desnudamento do tecido cervical dos dentes, bolsas periodontais, alteração na saúde gengival, ser um fator etiológico para a presença de diastema de linha média, restrição dos movimentos dos lábios, fonação, estética, deficiência de higienização devido à presença de uma camada espessa de tecido que pode interferir na harmonia dentofacial. O objetivo do estudo é relatar a intervenção cirúrgica de um caso clínico com a remoção do freio labial maxilar de uma paciente do sexo feminino, 12 anos de idade, que procurou atendimento na clínica de cirurgia da graduação da FOA-UNESP, encaminhada por seu ortodontista, para a correção do diastema na linha média. A técnica utilizada durante o procedimento cirúrgico foi o pinçamento único. O trans e pós operatório seguiram-se normalmente e a paciente foi liberada para continuar o tratamento ortodôntico.

Descritores: Freio, Diastema, Cirurgia.