

MUCOCELE EM LÁBIO INFERIOR: RELATO DE CASO CLÍNICO

TONINI, K. R.¹; MINOMI, T. M.¹; DOS SANTOS, C. C. V.¹; FAVERANI, L. P.¹; BASSI, A. P. F.¹; PONZONI, D.¹.

¹Departamento de Cirurgia e Clínica Integrada, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Mucoceles são lesões pseudocísticas benignas, que possuem como principais fatores etiológicos o trauma e a obstrução ductal, ocorrendo a ruptura de um ducto da glândula salivar e o extravasamento da mucina para dentro dos tecidos moles adjacentes. Caracterizam-se por ser assintomáticas e muitas vezes possuem rompimento espontâneo. Histologicamente, é compreendida por uma parede cística desprovida de epitélio que é delimitada por tecido de granulação e por células inflamatórias, incluindo numerosos histiócitos espumosos (macrófagos). As mucoceles geralmente se apresentam como aumentos de volume mucosos em forma de cúpula, que podem ter tamanhos variando de 1 a 2 mm a alguns centímetros, caracterizada como uma lesão flutuante, mas algumas são firmes a palpação. O tempo de evolução relatado para esta lesão varia de poucos dias a diversos anos; o sítio mais comum de envolvimento para esse fenômeno é o lábio inferior, sendo 80% dos casos encontrados nessa região. Algumas mucoceles são autolimitantes que se rompem e cicatrizam sozinhas, entretanto, muitas dessas lesões são de natureza crônica e a excisão cirúrgica local se faz necessária. Seu prognóstico é considerado excelente. O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão da literatura e apresentar o caso clínico do paciente MMAI, 30 anos, gênero masculino. Ao exame clínico foi constatada uma lesão circunscrita, de coloração semelhante à mucosa, de base séssil, firme à palpação, com um cm de diâmetro localizada em lábio inferior esquerdo, com hipótese diagnóstica de mucocele. Devido a lesão não se romper espontaneamente, optou-se pela excisão cirúrgica. Para o paciente relatado foi eleito o tratamento cirúrgico conservador com excisão total da lesão seguido do exame histopatológico, no qual foi comprovado a presença de mucocele e ausência que qualquer tipo de patologia maligna. A remoção cirúrgica das lesões com suspeita de mucocele é uma técnica rápida, segura e que permite o diagnóstico histopatológico da lesão.

Descritores: Cirurgia, Lábio Inferior, Mucocele.